

Protéjase contra la leptospirosis

La leptospirosis es una infección causada por la bacteria *Leptospira*. Hay varios tipos de *Leptospira* que pueden infectar tanto a seres humanos como a los animales.

¿Cómo se transmite la leptospirosis?

Las personas pueden contraer leptospirosis al tener contacto con:

- Orina de animales enfermos con la bacteria, como las ratas, ratones, ardillas, perros, cerdos, ganado y fauna silvestre.
- Aguas de inundación, agua dulce de ríos o arroyos, agua o tierra contaminada con la orina de animales infectados.



Síntomas

Si presenta síntomas de leptospirosis, consulte a un médico rápidamente. El tratamiento temprano con antibióticos puede ayudar a prevenir una enfermedad más grave.



Fiebre/escalofríos



Sarpullido



Dolor de estómago



Dolores musculares



Conjuntivitis (ojos enrojecidos)



Vómitos/diarrea



Dolor de cabeza



Tos



Ictericia (piel/ojos amarillentos)

Cómo prevenirlo

Los trabajadores agrícolas corren un mayor riesgo de infección. Las cortadas o rasguños en la piel expuestos a tierra o agua contaminada pueden causar una infección.



Utilice ropa y equipo protector impermeable, las camisas de manga larga, pantalones, y zapatos o botas.



Use agua y jabón para lavarse las manos antes y después de comer, beber, usar el baño, o atender animales.



Cubra cortadas o rasguños de la piel con vendajes impermeables.

